

Ueber
Epilepsie in ätiologischer Beziehung.

Inaugural-Dissertation

verfasst und der

hohen medicinischen Fakultät

der

kgf. Ludwig-Maximilians-Universität München

zur Erlangung der Doctorwürde

in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. D^R. F. SEITZ

vorgelegt

von

August Weddige

approb. Arzt aus Lüdinghausen (Westfalen).

München, 1883.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-UCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.

Ueber
Epilepsie in ätiologischer Beziehung.

Inaugural-Dissertation

verfasst und der

hohen medicinischen Fakultät

der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München

zur Erlangung der Doctorwürde

in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. D^R. F. SEITZ

vorgelegt

von

August Weddige

approb. Arzt aus Lüdinghausen (Westfalen).

München, 1883.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

DEM THEUREN ANDENKEN
SEINER VERSTORBENEN ELTERN

IN

KINDLICHER LIEBE UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM VERFASSER.

Der Herr Herr

SEINER VERSTÄNDLICHKEIT

ALLES WAS ER

WISSEN

WIE

Wie bei allen den Krankheiten, welche in letzter Instanz auf Störungen und Veränderungen im Centralnervensysteme, dem Gehirn und Rückenmarke, beruhen, lange Zeit hindurch durchaus nichts Sicheres über das eigentliche Wesen und den ihm zu Grunde liegenden feineren pathologischen Veränderungen bekannt war, — ich erinnere hier nur an die verschiedenen Systemerkrankungen des Rückenmarkes, *Tabes dorsalis*, *spottische Spinalparalyse* u. f. w., — und erst das tiefere Verständniß und die wissenschaftliche Begründung dieser Krankheitsformen gefördert wurden, als man exaktere Forschungs-Methoden zu kultiviren anfang und durch die Vervollkommnung der mikroskopischen Technik in allen ihren Beziehungen die pathologische Hiftiologie ihre grofsartigen Triumphe zu feiern begann, so war dies in gewisser Hinsicht auch in hohem Mafse der Fall, bei der Epilepsie, jener so sehr unangenehmen Krankheit sowohl für den unglücklichen Träger derselben, als auch für dessen Umgebung.

Der Symptomenkomplex dieser Krankheit war schon den Aerzten des Alterthums wohl bekannt.

In den Schriften des Hippokrates,¹⁾ der die Epilepsie eine heilige Krankheit nennt, woher die noch jetzt hin und wieder übliche Bezeichnung als *Morbus sacer* stammt, und welcher glaubte, dafs sie den Menschen von den Göttern zugesandt worden sei, finden wir schon ein klinisches Bild unserer Krankheit entworfen, welches in Bezug auf die Symptome als ganz mustergültig gelten kann, dem allerdings im Laufe der

¹⁾ De morbo sacro. Cap. I. Chart. Tom X. pag. 475.

Jahrhunderte nach und nach noch andere, mehr oder weniger wesentliche Punkte beigelegt worden sind.

Auch dem Aristoteles¹⁾ war diese Krankheit bekannt, der sie eine herkulische nennt, weil er glaubte, daß Hercules mit derselben behaftet gewesen sei. In ebenderfelben Weise denkt Galenus¹⁾ dieser Krankheit, um mit dieser Bezeichnung entweder die Größe der Krankheit selbst anzudeuten, oder um mit derselben die Schwierigkeit und Hartnäckigkeit dieser Krankheit zu bezeichnen.

Sucht man aber in den Schriften dieser alten Aerzte und denen der späteren Jahrhunderte bis auf die letzten Dezzennien nach einer Erklärung des Wesens dieser eigenartigen Krankheit auf anatomisch-physiologischer und pathologisch-anatomischer Grundlage, so wird man allerdings Versuche dieser Art keineswegs vermissen. Von jeher hat man sich bemüht, irgend welche plausible Erklärung für das Wesen dieser Krankheit zu finden und aufzustellen, welche aber leider nur zu häufig an's Wunderbare und Unbegreifliche streiften. Man kam eben nicht weiter als zu Hypothesen der verschiedensten Art und Gestalt, ohne sie auf irgend eine feste Basis stützen zu können. Es würde zu weit führen und hätte auch keinen Zweck, wenn ich all' die Ansichten und Theorien, welche Aerzte älterer und neuerer Zeit über den Begriff, das Wesen und die Ursachen der Epilepsie aufgestellt haben, des weiteren erörtern wollte, aber ich möchte doch hier wenigstens eine dieser Ansichten anführen und zwar die von dem großherzoglich weimarschen Medizinalrathe Professor Dr. Loebenstein-Loebel, wie er sie im Jahre 1818 in seinem Buche: „Wesen und Heilung der Epilepsie“, niedergelegt hat, und zwar, wie er selbst sagt, als ein hypothetisches Produkt, welches er aus dem Leben selbst aufgenommen und abstrahirt habe. Das Wesen der Convulsionen und besonders der Epilepsie, ist nach seiner Ansicht in

¹⁾ Problem. sect. XXX. Quaest. I. Tom IV. pag. 227.

²⁾ Comm. in Libr. VI. Epidem. Chart Tom IX. pag. 550.

dem grofsen und kleinen Gehirn begründet, wenn nämlich stattfindende Schädlichkeiten die typösen Contractiv- und Expansiv-Akte, wie er sie als im Gehirne, dem ersten Keime des ganzen thierischen Körpers und dem ursprünglichst entwickelten Organe, vor sich gehend sich denkt, stören und aufheben, und dadurch eine monomachische Oscillation in dem Centralorgane des Nervensystems verursachen. Ein krankhaftes Oscilliren sei in der Epilepsie gar nicht zu verkennen, welches sich dann sympathisch den übrigen Nervengebilden und Nervenperipherien mittheile, und durch diese ungewöhnlichen Nervenzusammenziehungen und Ausdehnungen müßten und würden zu gleicher Zeit die Muskeln und die übrigen Gebilde des Organismus zu blitzähnlichen Bewegungen gezwungen. Dem zu Folge könne sich in der Epilepsie das Gehirn entweder überwiegend kontraktiv oder expansiv, und in manchen Individuen sehr häufig in gewissen Momenten zu gleicher Zeit aber ungewöhnlich schnell kontraktiv und expansiv darstellen. Diese Erscheinungen können nun nach der Ansicht des Autors entweder durch eine erhöhte, krankhaft gesteigerte Empfindlichkeit, oder auch durch eine mehr herabgestimmte Thätigkeit im Gehirne oder in dem gesammten Nervensysteme bedungen werden. Die Folge von diesen stattfindenden Mifsverhältnissen im Gehirn und dem übrigen Nervensysteme sei dann eine Aufhebung oder Trübung der Geistesfunktionen, welche sich während des Anfalles, nämlich des epileptischen, darbiete, und wodurch zugleich die Differenz der Spasmen von den Convulsionen in der Naturgeschichte der Krankheiten zu erkennen gegeben würde. Weiter führt er dann aus, dafs sich die Epilepsie als Folge des ergriffenen dynamischen Lebensprozesses im Gehirn oder durch gesetzte mechanische oder chemische schädliche Einwirkungen darstellen könne, oder durch Schädlichkeitsmomente konstituiert werde, welche in den niedern Sphären des Organismus sich vorfänden, und sekundär feindlich auf das Centralorgan der Nervenphäre einwirkten, und sekundär die Epilepsie bedingen.

So kommt der Autor zu zwei Formen der Krankheit, nämlich zur idiopathischen und zur sympathischen Epilepsie; doch hierüber später. Loebenstein verlegte also in seiner hier in Kürze dargestellten Hypothese schon ganz richtig den eigentlichen Sitz der Krankheit in das Gehirn; aber über die genauere Lokalisation des Krankheitsfokales im Gehirn selber fehlt ihm noch jegliche Anschauung, ja selbst für seine Ansicht, daß die Krankheit vom Gehirn aus bedingt sei, vermag er eine Begründung nicht anzugeben; er kommt eben auch nicht weiter als zu einer Hypothese ohne sicheren Boden.

Und so ist man auch nicht eher weiter gekommen, als man an der Hand der schon gefundenen wichtigen Entdeckungen auf dem Gebiete der Gehirnphysiologie anfang, am Versuchsthiere künstlich Epilepsie zu erzeugen und diese Versuchsergebnisse kritisch zu analysiren suchte. Vor Allen gebührt Kussmaul das Verdienst, in dieser Richtung den Weg angebahnt zu haben, um nach und nach zum richtigen Verständniß des Wesens und der Aetiologie der Epilepsie zu gelangen. An zweiter Stelle sind die Arbeiten von Brown-Séquard zu nennen, denen sich im Laufe der Jahre diejenigen anderer Forscher, wie Westphal, Hitzig, Tenner und mehrerer anderer angeschlossen haben.

Bevor ich jedoch die wichtigsten Ergebnisse der Arbeiten und Versuche dieser Forscher zusammenzustellen versuchen werde, ist es, wie ich glaube, zuvörderst äußerst wichtig, den Begriff der Epilepsie, das, was man sich eigentlich unter dieser Erkrankung vorzustellen hat, zu entwickeln.

Hatte früher Boerhaave den Begriff der Epilepsie folgendermaßen definiert: »Epilepsia est abolitio subita omnium functionum animalium, cum augmento motuum vitalium et motu convulsivo in omnibus musculis corporis,« und wurde dieser Definition später nur der Begriff »chronisch« hinzugefügt, so hat sich dieselbe in den letzten Jahrzehnten nicht halten können.

Als man sich überzeugt hatte, theils durch sorgfältig

angestellte Thierversuche, theils durch wiederholt gefundene Obduktionsbefunde, daß nach ganz bestimmten anatomischen Veränderungen im Gehirn oder Rückenmarke oder anderen Organen des Körpers Infulte, welche den epileptischen ganz ähnlich erscheinen, vorkommen, da fing man an derartige Zustände von dem Krankheitsbilde der Epilepsie zu trennen. Damit fällt die früher als symptomatische Epilepsie beschriebene Krankheitsform aus dem Rahmen fort. In derselben Weise verhält es sich mit der sogenannten toxämischen Epilepsie, ich meine hier die Convulsionen, wie man sie so häufig nach akuten oder chronischen Vergiftungen, besonders mit Blei zu beobachten Gelegenheit hat. Etwas anders verhält es sich mit der Form der Epilepsie, welche man, wie es auch, wie vorhin erwähnt, Loebenstein gethan hat, als sympathische oder Reflex-Epilepsie bezeichnet hat. Die neueren Ansichten hierüber stimmen nicht mehr mit der des um die Erforschung des Wesens und der Pathologie der Epilepsie so sehr verdienten Ruffel Reynolds überein, welcher die Epilepsie als eine chronische Krankheit definirt, welche sich durch gelegentlichen und temporären Verlust des Bewußtseins, mit oder ohne nachweislicher Muskelcontraction auszeichnet. Dieser Forscher will die sympathische oder Reflex-Epilepsie gestrichen haben; man soll nach ihm die Epilepsie als eine genuine, als eine idiopathische Krankheit, als ein morbus per se auffassen, welche sich von excentrischen Convulsionen, von toxämischen Spasmen, von den Convulsionen, welche bei organischen Veränderungen des cerebrospinalen Centrums vorkommen, und von jeder anderen bekannten und erkennbaren Krankheit unterscheidet. Dieser Forscher stellte alsdann im Jahre 1855 das Prinzip auf, daß in den zahlreichen Fällen von Epilepsie, in denen weder eine organische Veränderung, noch eine Blutkrankheit, oder ausgesprochene excentrische Irritation nachgewiesen werden könne, die Krankheit eine idiopathische, daß diese idiopathische Störung Alles sei, was in ihr vorhanden, daß sie in zahlreichen

Fällen sozusagen die Idee der Epilepsie ausmache und daß daher, wenn in anderen Fällen Strukturveränderungen, Blutkrankheiten oder excentrische Irritation in Verbindung mit Convulsionen angetroffen werden, welche sie, nachgewiesener Maßen, hervorbringen, solche Fälle nicht mit demselben Namen belegt werden sollten.¹⁾ Doch man ist hierin der Ansicht Ruffel Reynolds nicht gefolgt, sondern hält noch heute an dem Begriffe der sympathischen Reflexepilepsie fest.

Dagegen bezeichnet man neuerdings mit dem Namen »secundäre Epilepsie« diejenigen Fälle, bei welchen die epileptische Veränderung vom Rückenmark oder seltener vom Großhirn aus angeregt und vermittelt wird, im Gegensatze zur idiopathischen Epilepsie, bei welcher eine solche Anregung nicht nachzuweisen ist.

Endlich sind nach Nothnagel noch alle diejenigen Fälle als wirkliche Epilepsie anzusprechen, für welche Griesinger den Namen »epileptoide Zustände« eingeführt hat. Dagegen hat man in neuerer Zeit die von Brown-Séquard und Charcot eingeführte Bezeichnung *Epilepsia spinalis* oder Rückenmarksepilepsie, welche von einer wirklich vorhandenen Rückenmarksläsion ausgeht, und in jenen eigenthümlichen Krämpfen der Unterextremitäten besteht, wieder fallen lassen, weil dieselbe unter den Begriff der sekundären Epilepsie eingereiht werden müsse. Ja, Rudolf Arndt behauptet sogar, daß diese hier in Frage kommende Form durchaus nichts mit Epilepsie zu thun habe, da diese Krämpfe durchaus von keiner Bewußtseins-Störung begleitet seien, was unbedingt zum Begriffe Epilepsie gehöre.²⁾

Nach alledem ist es somit ganz klar und zweifellos, daß man eine genaue und präzise Definition des Begriffes Epilepsie nicht zu geben im Stande ist; vielmehr ist dieselbe nur ein klinisch-symptomatologischer Prozeß, kein anatomischer. Und dennoch

¹⁾ Reynolds Epilepsie, übersetzt von Beigel.

²⁾ Arndt, Lehrbuch der Psychiatrie. 1883.

mufs nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft unter Epilepsie ein ganz bestimmter krankhafter Zustand verstanden werden, welcher sich zusammensetzt aus einer dauernden Veränderung im Centralnervensystem und aus den äufseren Erscheinungen, welche den sogenannten epileptischen Anfall ausmachen. Dabei ist jedoch nach Arndt unbedingt festzuhalten, dafs bei allen Krampfformen, welche als epileptische angesprochen werden sollen, die Bewusstseins-Störung nie fehlen darf, denn diese gerade ist für alles Epileptische charakteristisch und unterscheidet die epileptischen Krampfformen von hysterischen und andern Krämpfen und zwar in dem Mafse, dafs, wie eine reiche Erfahrung gelehrt hat, wohl im einzelnen epileptischen Anfalle alle nur einigermafsen sich bemerkbar machende Krampfformen fehlen können, eine, wenn auch nur ganz kurz andauernde momentane Umflorung des Bewusstseins nie fehlen darf. Man hat diese gewissermafsen leichtesten epileptischen Anfälle und die ihnen zu Grunde liegenden Anomalien als epileptoide Zustände im Sinne Griefinger's, wie vorhin schon angedeutet wurde, bezeichnet, welcher auf ihre mannigfache Geartung und ihre weit gehende Bedeutung aufmerksam gemacht hat. Ferner ist jedoch nach der Ansicht von Arndt auch wohl zu berücksichtigen, dafs überhaupt zwischen Krankheit und Gesundheit keine scharfe Grenze gezogen ist, sondern dafs die eine in die andere, wie in ruhigem Flusse, durch die leisesten Abstufungen übergeht. So soll nach ihm auch die Epilepsie nicht streng vom gesunden Leben geschieden sein, sondern sich aus ihm ganz allmählig entwickeln, ja mit ihren Anfängen noch ganz und gar in seine Breite hineinfallen. So glaubt dieser Autor, dafs viele der von Griefinger als epileptoide bezeichneten Zustände, wie die zeitweise eintretenden kurzen und leichten Schwindelgefühle, die ab und zu kommenden Ohnmachtsanwandlungen, die hier und da auftretenden Angstempfindungen hierher zu rechnen seien.

Nun sei es mir noch gestattet mit einigen Worten auf das Verhältniß zwischen Eklampsie und Epilepsie etwas näher einzugehen; ich halte mich hier an die Ansicht von Arndt, wie er sie in seinem Lehrbuche der Psychiatrie entwickelt hat. Unter eklamptischen Krämpfen oder Eklampsie begreift Arndt stärkere oder schwächere Convulsionen mannigfaltigster Art, welche nur gelegentlich auftreten, durch einige oder mehrere Paroxysmen, die mit Pausen der Ruhe wechseln, mehr oder minder rasch vorübergehen und für immer oder doch für lange Zeit, ja jahrelange Zeit, die keinen Typus in ihrer Wiederkehr erkennen läßt, verschwinden, die aber immer, wenn sie auftreten, mit einer größeren oder geringeren Störung des Bewußtseins verbunden sind. Diese Krämpfe kommen am häufigsten im Kindesalter vor und stellen da die sogenannten Gichter oder Fraisen dar, an denen namentlich zarte, schwächliche Individuen leiden. Häufen sich nun, so führt Arndt weiter aus, die eklamptischen Anfälle und kehren sie in bestimmten Pausen wieder, so geht aus ihnen die Epilepsie hervor. Deshalb entwickle sich anscheinend auch gar nicht so selten die Epilepsie aus der Eklampsie, und würden Leute in ihrem späteren Leben epileptisch, welche in ihrer Jugend an Eklampsie gelitten hätten. Die Eklampsie erscheine darum auch vielfach als akute Epilepsie, und diese letztere wieder als eine chronisch gewordene Eklampsie. Doch dürfte das Wahre an der Sache sein, daß Eklampsie und Epilepsie ein und dasselbe ist, und daß es lediglich von den Ursachen abhängt, welche die bezüglichen Krämpfe hervorrufen, ob diese oder jene vorliegt. Sind die Ursachen nämlich mehr zufällige und vorübergehende, so Eklampsie; sind sie mehr wesentliche und andauernde, so Epilepsie. Indessen dürfe man dabei keineswegs an ein bestimmtes epileptisches Agens denken, das im Körper sich entwickelt hätte und die Anfälle hervorriefe und unterhielte, sondern nur an eigenthümliche hyperkinetische Verhältnisse, die gerade den eigenthümlichen Symptomenkomplex

bewerkstelligen. Ob Epilepsie, ob Eklampsie hänge deshalb ganz und gar allein von der Folgezeit ab, und im gegebenen Falle entscheiden zu wollen, ob diese oder jene vorliegt, hält Arndt, wenn sonst keine näheren Anhaltspunkte gegeben sind, trotz aller gegentheiligen Behauptungen geradezu für ein Unding. In dieser Beziehung dürfte jedoch Arndt mit seiner Ansicht, die jedenfalls etwas schroff ist, isolirt dastehen.

Nach diesen kurzen Bemerkungen über den Begriff »Epilepsie«, will ich nun versuchen in kurzen Zügen die wichtigsten Resultate aus den Versuchsreihen, welche von Brown-Séquard, Westfal, Hitzig und besonders von Kufsmaul und Tenner zur Erklärung und Deutung der Aetiologie der Epilepsie einerseits und ihrer Symptome andererseits angestellt wurden, hier anzuführen und daran auch die diesbezüglichen physiologischen Forschungen kurz berühren, um mich dann zur Schilderung der Aetiologie der Epilepsie selbst zu wenden.

Was zunächst die Experimente Brown-Séquard's, ¹⁾ der sich sehr verdient gemacht hat, um die Pathogenese der Epilepsie, angeht, so wies dieser Forscher nach, daß nach Verletzungen verschiedener Theile des Nervensystems bei Thieren sich ein epileptischer Zustand entwickelt, so nach Verletzungen der medulla spinalis, nach Durchschneidung eines oder beider nervi ischiadici, nach Läsionen der medulla oblongata, des pedunculus cerebri und der corpora quadrigemina. Nach derartigen Verletzungen sah Brown-Séquard theils spontan, theils nach Reizung einer bestimmten Hautparthie, welche von dem Forscher als epileptogene Zone bezeichnet wurde, epileptische Anfälle entstehen, welche in wechselnder Häufigkeit wiederkehrten. Die epileptogene Zone selbst fand der Forscher verschieden; bald umfaßt sie nur die Wange und die vordere seitliche Halsgegend, bald erstreckt sie sich längs der ganzen Wirbelsäule; sie liegt bei Verletzungen peripherer

¹⁾ Ziemssen, Handbuch der spez. Path. und Therapie. Band XII. 2.

Nerven und des Rückenmarkes immer auf derselben, bei Läsionen des pedunculus cerebri dagegen auf der kontralateralen Seite. Dann hat ferner Brown-Séguard die wichtige Beobachtung gemacht, daß Junge von solchen Thieren, an denen er künstlich Epilepsie erzeugt hatte, spontan ohne irgendwelche Verletzung epileptisch werden können.

Diese Versuche und Resultate Brown-Séguard's sind von Schiff und Westhal und ebenfalls auch von Nothnagel bestätigt worden.

Dann will ich hinweisen auf den Versuch von Westphal,¹⁾ welcher durch leichtes Beklopfen des Kopfes bei Thieren einen Anfall von allgemeinen Convulsionen ausbrechen sah. Die Thiere erholen sich alsbald und es ist nichts Auffallendes an ihnen zu bemerken, bis nach Verlauf von einigen Wochen sich wohl charakterisirte epileptische Anfälle, welche theils spontan, theils nach Reizung jener oben erwähnten epileptogenen Zone entstehen, einstellen. Tödtete Westphal nun diese Thiere, so fand er immer ohne Ausnahme kleine Hämorrhagien in der medulla oblongata und im oberen Halsmark.

Daß durch künstliche Produktion von Krankheitsprozessen an der Großhirnrinde Epilepsie hervorgebracht werden kann, hat Hitzig durch einige interessante Versuche, welche er in seinen Untersuchungen über das Gehirn (Berlin 1874) veröffentlicht hat, nachgewiesen. So zerstörte er z. B. das Rinden-centrum für die vorderen Extremitäten und nach kürzerer oder längerer Zeit traten wohlcharakterisirte epileptische Anfälle ein, welche durch nichts anderes, als durch die vorgenommene Verletzung der Großhirnrinde bedingt sein konnten, weil sich bei der Obduktion absolut kein anderer pathologischer Prozeß im Gehirne nachweisen ließ, von dem aus sich die Erscheinungen *intra vitam* etwa hätten erklären lassen.

¹⁾ Berliner klinische Wochenschrift 1871. Nr. 38.

In welchem Zusammenhange dann ferner die Anämie des Gehirnes mit den epileptischen Erscheinungen steht, darüber ist wesentlich Licht verbreitet worden durch die zahlreichen und lehrreichen Experimente, welche Kufsmaul und Tenner angestellt haben.¹⁾ Sie zeigten zunächst, daß nach einer schnell und energisch eintretenden Blutleere des Gehirns durch Verblutung oder durch Compression oder plötzliche Unterbindung der großen arteriellen Gefäßstämme bei kräftigen, warmblütigen Thieren ohne Ausnahme tiefes Coma und allgemeine konvulsivische und epileptische Zuckungen eintreten, welche wieder verschwinden, sobald das Gehirn wieder in normaler Weise mit arteriellem Blute gespeist wird. Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle hier einschlägigen Versuche von Kufsmaul und Tenner der Besprechung unterziehen; ich glaube es wird genügen, wenn ich die Resultate und die Sätze, welche die Forscher aus ihren Versuchsreihen gewonnen haben, hier kurz aufzähle; es sind folgende:

1. Die Krämpfe, welche bei der Verblutung warmblütiger Thiere und des Menschen eintreten, gleichen denjenigen, welche bei der Fallfucht beobachtet werden.

2. Krämpfe von derselben Form treten ein, wenn das Gehirn plötzlich seines rothen Blutes beraubt wird, wie dies bei der Unterbindung der großen Schlagaderstämme des Halbes der Fall ist.

3. Fallfuchtartige Krämpfe werden ebenfalls erzielt, wenn das arterielle Blut rasch die venöse Beschaffenheit annimmt, wie dies bei der Unterbindung durch die Luftröhre geschieht.

4. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daß der Eintritt der Krämpfe in diesen Fällen abhängt von der plötzlich unterbrochenen Ernährung des Gehirns. Er ist nicht bedingt durch die veränderten Druckverhältnisse, unter welche das Gehirn gestellt wird.

¹⁾ Moleshotts Untersuchungen zur Naturlehre. Bd. 3 und 4.

5. Die fallfüchtigen Krämpfe bei der Verblutung gehen nicht vom Rückenmark aus;

6. sie gehen auch nicht vom Großhirn aus;

7. ihr Centralheerd ist vielmehr zu suchen in den excitablen Bezirken des Gehirnes, welche hinter den Sehhügeln gelegen sind.

8. Anämie der vor den Großhirnschenkeln gelegenen Hirntheile bedingt beim Menschen Bewusstlosigkeit, Unempfindlichkeit und Lähmung; wenn Krämpfe dabei entstehen, so müssen auch excitable Theile hinter den Sehhügeln Veränderungen erlitten haben.

9. Anämie des Rückenmarkes bedingt Lähmung der Gliedmaßen, der Rumpf- und Athemmuskeln. Erreicht die Blutarmuth plötzlich den höchsten Grad, so gehen der Lähmung nur selten leichte zitternde Bewegungen der Gliedmaßen voraus.

10. Die Krämpfe bei der Verblutung sind weder psychische, noch sind sie Reflexkrämpfe.

11. Die Krämpfe bei der Verblutung treten nicht ein:

a. bei Kaltblütern, wenigstens nicht beim Frosche;

b. wenn die Verblutung langsam vor sich geht, so daß die Kräfte allmählich aufgezehrt werden;

c. wenn die Thiere sehr geschwächt sind;

d. wenn die Ernährung des Rückenmarkes gelitten hat;

e. wenn große Stücke der excitablen Gehirnprovinzen entfernt sind;

f. bei antherisirten Thieren;

g. zweifelsohne auch, wenn die excitablen Gehirnbezirke gewisse pathologische Veränderungen erlitten haben.

12. Zur Heilung der durch Blutmangel bedingten fallfüchtigen Krämpfe ist kein Mittel geeigneter, als die erneute Zufuhr rothen Blutes.

13. Die Erscheinungen des unvollkommenen fallfüchtigen Anfalles lassen sich aus Veränderungen des Großhirns allein

herleiten, die Erscheinungen des vollkommenen Anfalles dagegen setzen eine Veränderung des ganzen Gehirns voraus. Die Krämpfe in der Fallfucht sind mit Recht als cerebrale zu bezeichnen, und das Rückenmark spielt dabei wahrscheinlich die Rolle eines Leiters, wobei es die Anstöße, welche es vom Gehirn her empfängt, den Muskeln übermittelt.

14. Umschriebene anatomische Veränderungen des Gehirnes oder Veränderungen von längerer Dauer können die nächste Ursache epileptischer Anfälle nicht darstellen, wohl aber fallfüchtige Zustände bedingen, zur Fallfucht disponiren.

15. Der fallfüchtige Zustand, der zu den Anfällen disponirt, nimmt bald das ganze Gehirn ein, bald nur einzelne Bezirke, von denen aus das übrige Gehirn in denjenigen veränderten Zustand gebracht wird, welcher dem fallfüchtigen Anfall zu Grunde liegt.

16. Die medulla oblongata scheint als Ursprungsstelle der Glottisverengerer und der vasomotorischen Nerven häufig den Ausgangspunkt eklamptischer und epileptischer Anfälle darzustellen.

17. Die pathologische Anatomie vermag keinen Aufschluss über das Wesen der Epilepsie zu geben.

Dies sind im Wesentlichen die Sätze, welche Kufsmaul und Tenner auf Grund ihrer Versuche aufzustellen sich berechtigt sahen.

Weiterhin hat dann noch Nothnagel auf dem Reflexwege durch Reizung peripherer sensibler Nerven eine Verengerung der Hirnarterien und so eine Hirnanaemie zu erzeugen versucht, und so auch epileptische Anfälle herbeigeführt, welche Versuche von Krauspe bestätigt wurden.

Ob auch Hirnhyperämie im Stande sei, Epilepsie zu erzeugen, darüber gehen die Meinungen noch auseinander. Kufsmaul und Tenner durchschnitten am Kaninchen beiderseits die Halssympathici und unterbanden beiderseits die venae jugulares externae und internae, brachten jedoch durch

die so gesetzte Hirnhyperämie keine epileptischen Zuckungen zu Stande.

Im Gegenfatze hierzu zeigte jedoch später Landois,¹⁾ fowie auch Hermann und Escher wenigstens für Katzen, dafs Hirnhyperämie doch im Stande sei durch venöse Stauung Convulsionen epileptischer Natur hervorzurufen. Nach L. Landois find die fowohl durch Anämie als Hyperämie des Gehirns entstehenden Zuckungen und Convulsionen dadurch zu erklären, dafs das Krampfcentrum durch den plötzlich unterbrochenen normalen Gaswechsel in den rothen Blutzellen gereizt werde.

Was nun die Stelle im Gehirne angeht, von wo aus die allgemeinen Convulsionen angeregt werden, so liegt dieselbe nach den Untersuchungen von Kufsmaul und Tenner, wie oben schon angedeutet, in den zwischen Rückenmark und Hirnschenkeln gelegenen Hirntheilen, also im pons und in der medulla oblongata. Nothnagel ergänzte diese Untersuchungen weiter dahin, dafs das Krampfcentrum, d. h. die umschriebene Stelle des Gehirnes, von wo aus die gesammte willkürliche Muskulatur des Körpers auf dem Wege der reflektorischen Erregung in tonische und klonische Krämpfe versetzt werden kann, im pons gelegen sei, spätere Untersuchungen von L. Landois jedoch wiesen dieses Centrum als in der medulla oblongata gelegen nach.

Schon Schröder van der Kolk, der sich vor ungefähr dreifsig Jahren eingehend mit dem Studium der Epilepsie befaßt hat, hat darauf hingewiesen, dafs bei den allgemeinen Krämpfen der Epileptiker der Sitz der Erregung innerhalb der medulla oblongata zu suchen sei, deren Gefäße er bei Obduktionen von Individuen, welche intra vitam das ausgeprägte Bild der Epilepsie dargeboten hatten, erweitert und vermehrt fand, so dafs sie zumal bei starker Füllung mecha-

¹⁾ Landois, Lehrbuch der Physiologie, 1880.

nisch reizend auf die Nervensubstanz der medulla oblongata wirken mußten.

Nun ist es ferner durch die Untersuchungen von Landois erwiesen, daß Reizung sensibler Nerven durch Erregung des Centrums der Vasomotoren, welches nach ihm etwa $2\frac{1}{2}$ mm zu beiden Seiten der Mittellinie in dem Theile der medulla oblongata gelegen ist, welcher die Verlängerung der Seitenstränge des Rückenmarkes darstellt, sowohl eine plötzliche Verengerung als auch Erweiterung der Gefäße nach sich ziehen kann. Findet dieser Vorgang an den Gefäßen der medulla oblongata statt, so wird plötzliche Anämie oder momentane Blutüberfüllung in derselben sich ausbilden müssen. Beide Zustände vermögen aber, wie oben schon mitgetheilt wurde, das in ihr gelegene Krampfcentrum so zu reizen, daß es zum Ausbruche von allgemeinen epileptischen Konvulsionen kommt.

Ob nach Anämie der medulla spinalis auch epileptische Insulte ausbrechen können, darüber liegen noch keine abgeschlossenen Untersuchungen vor; als erwiesen steht fest, daß das Rückenmark das Leitungsorgan für die Krämpfe ist und zwar gibt nach Landois die graue Substanz des Rückenmarkes die Leitungsbahn für die krampfartigen, unwillkürlichen, unkoordinirten Bewegungen ab, welche von da ab überall durch die vorderen Wurzeln weitergeht.

Nach der Meinung von Landois und Eulenburg scheint die Mehrzahl derjenigen Fälle von Epilepsie, welche der Reizung centripetalleitender Nerven ihren Ursprung verdanken und bei denen die Anfälle somit häufig von einer deutlichen Aura angezeigt werden, der Wirkung der Vasomotoren zugesprochen werden zu müssen; es würde sich hier also um eine Gefäßneurose handeln, vielleicht ähnlich, wie Hofrath Gerhardt in Würzburg auch die Chorea als eine solche Gefäßneurose auffaßt. Selbstverständlich kann man auch durch direkte Reizung der medulla oblongata den Ausbruch von Krämpfen erzeugen.

Dafs direkte anderweitige Gehirnreizung epileptische Konvulsionen zu erzeugen im Stande ist, ist vorhin schon besprochen worden; dafs dabei aber eine Betheiligung vasomotorischer Nerven nicht wohl ausgeschlossen werden könne, ist nach Landois sehr wahrscheinlich, da nach seinen und Eulenburg's Versuchen die vasomotorischen Nerven der kontralateralen Körperhälfte durch Reizung bestimmter Gebiete der Oberfläche der Großhirnrinde erregbar gefunden wurden. Doch ist eine Mitwirkung der diesen Punkten nahe liegenden motorischen Zone deshalb sehr wahrscheinlich, weil die Beobachtungen von Landois, Fritsch, Hitzig, Ferrier und Eulenburg nach stärkerer Reizung dieser motorischen Rindengebiete ausgeprägte epileptische Konvulsionen bei Hunden ergaben.

Auch Hughlings-Jackson zeigte an der Hand klinischer und pathologischer Beobachtung, dafs konvulsivische Bewegungen der einen Körperhälfte durch krankhaft lokalisirte Reizung der Rinde der kontralateralen Hemisphäre in der Nähe des corpus striatum hervorgerufen werden.

Wenn ich nun nach diesen kurzen Mittheilungen der wichtigsten Experimental-Studien und deren Resultate über das Wesen der Epilepsie, welche vorausszuschicken ich für nöthig erachtete, zur Schilderung der Aetiologie dieser so unangenehmen und ziemlich verbreiteten Krankheit übergehe, so soll es nun meine Aufgabe sein, in kurzen Zügen die wichtigsten Ansichten, welche in Bezug auf diese meist noch so wenig mit Sicherheit beantworteten Frage herrschen und sich im Allgemeinen bei den Klinikern Geltung verschafft haben, darzustellen, dieselben zu begründen suchen theils durch die gewonnenen Resultate aus den Thierversuchen, theils durch feststehende physiologische Thatfachen und Grundsätze, theils durch die Summe der Erfahrungen älterer und neuerer Kliniker und im Anschlusse hieran die Fälle mitzutheilen und zu veröffentlichen und sie in ihrer Aetiologie so weit es möglich ist zu erörtern, welche ich im Sommer-Semester 1882 in der hiesigen

königlichen medicinischen Poliklinik durch die zuvorkommendste Güte und größte Liebenswürdigkeit meines hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. Dr. Seitz, zu beobachten Gelegenheit fand.

Zu allernächst hat man, worauf Nothnagel ganz besonders und ausdrücklich aufmerksam macht, wohl zu unterscheiden zwischen zwei Fragen, wenn man zu einem richtigen Verständniß der Aetiologie der Epilepsie kommen will, nämlich:

1. Wodurch wird die epileptische Veränderung erzeugt?
und
2. Welche Momente veranlassen den Ausbruch der epileptischen Anfälle.

Nothnagel theilt nun in Bezug auf die erste Frage alle Fälle folgendermaßen ein:

- 1) in solche, bei denen die epileptische Veränderung durch Momente anatomisch nicht palpabler Art, welche bald nur das Nervensystem, bald den Gesamtorganismus betreffen, hervorgerufen ist;
- 2) in solche, bei denen sich eine ganz bestimmte Läsion des Nervensystemes anatomischer Art als Ursache der Krankheit nachweisen läßt;
- 3) in solche, bei welchen gar keine plausible Ursache aufzufinden ist und wo man sich die Entwicklung der Krankheit als spontan zu denken hat.

Was nun zunächst die Fälle ersterer Art anbetrifft, so stimmen alle Autoren ohne Ausnahme darin überein, daß die Epilepsie von Ascendenten auf die Descendenten vererbt werden kann. Da ja Brown-Séquard gezeigt hat, daß Junge von solchen Thieren, an denen er künstlich Epilepsie erzeugt hatte, auch in ihrem späteren Leben früher oder später epileptisch werden, so hat man keinen Grund, diese Vererbung beim Menschen ohne weiteres auszuschließen, vielmehr muß uns diese Thatfache entschieden zu der Annahme berechtigen, daß dieselbe Verhältniß ebenfogut beim Menschen vorwalten

kann, da ja doch die Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere ganz genau dieselbe ist. Andererseits spricht für die Wahrheit dieser Thatfache die ungemein reiche Erfahrung der Forscher und Kliniker auf diesem Gebiete, worauf ich sogleich noch zurückkommen werde. Worin das Wesen der erblichen Belastung nun eigentlich besteht, darüber gibt der schon mehrfach citirte Prof. Arndt in seinem Lehrbuche der Psychiatrie eine ebenso wissenschaftliche als natürliche und leicht faßliche und doch eingehende Erörterung. Nach diesem Forscher kommt die neuropathische Diathese oder Disposition, wie er sich ausdrückt, dadurch zu Stande, daß bei einem Individuum das Nervensystem von einem bestimmten Zeitpunkte an, in anderen Fällen von Anfang an, ohne daß jemals irgendwelche erhebliche Ansprüche an dasselbe gestellt worden wären, wie ein ermüdeter oder absterbender Nerv reagirt, der doch auch nur seine spezifische Reaktion bethätigt, weil zuviel Substanz verbraucht worden ist, ohne daß ein genügender Ersatz stattgefunden hätte. Es offenbart ein solches Nervensystem damit, daß es nicht die Fähigkeit besitzt, sich aus dem vorhandenen Materiale leicht zu ergänzen oder überhaupt jemals zu der Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, welche als die gewöhnliche und daher als die normale zu betrachten ist. Diese neuropathische Disposition kann nun angeboren, oder erworben sein. Im ersteren Falle ist sie nun, und das ist, wenn nicht in allen, so doch in den allermeisten Fällen so, ererbt. In dieser Beziehung aber, sagt Arndt, ist festzuhalten, daß die ererbte Disposition nicht auf einem mythischen Agens, sondern auf den Verhältnissen der Emphyse beruht, worunter er die Energie versteht, womit die zu selbstständigem Sein abgestoßenen elterlichen Zellen sich und ihre Abkömmlinge in ihrer Eigenart zu erhalten bestrebt sind und wovon es abhängt, wie weit die Eigenschaften der Eltern vererbt werden, wie weit nicht. Es werden zunächst nur auf Grund einer Hypemphyse, gleichviel wodurch bedingt,

in Folge der Schwäche der Erzeuger, Hypoplasien in's Leben gerufen, die für's Erste blos in dem Centralnervensysteme und darnach erst, und zwar vermittelt dieses, in anderen Organen sich bemerkbar machen. So erklärt sich ganz gut nach Arndt die Vererbung derselben Schwächen, derselben Mängel, derselben Fehler, die Neigung zum Spiele, zur Trunksucht, zur Wollust, zum Selbstmorde u. f. w. Nun aber, führt Arndt weiter aus, ist es nicht nöthig, daß dies Alles zu geschehen braucht, wie geschildert, sondern es vererbt sich blos, und das ist das Gewöhnlichste, nur die Schwäche, und mit ihr natürlich auch die Bildungsschwäche des jeweiligen Nervensystemes, der zu Folge es auch in ihm erst zu Hypoplasien kam, und auf Grund dieses Umstandes kann es dann in dem neu entstehenden Gehirn und Rückenmarke, wie zu den nämlichen Hypoplasien und den davon abhängigen Schwächen, wie bei Vater oder Mutter, so auch zu ganz anderen, scheinbar selbst heterogenen kommen, ohne daß dadurch die Erbliehkeitsgesetze auch nur im Geringsten eine Ausnahme erfüllen. So erklärt es sich dann auch ganz leicht und ungezwungen, daß ein an Rückenmarksschwäche, sogenannter Spinalirritation, leidender Vater einen Sohn haben kann, welcher eben wegen seiner unglücklichen Erbschaft an Epilepsie leidet, einer Krankheitserscheinung, die, wie Arndt sagt, vornehmlich auf einer reizbaren Schwäche der medulla oblongata und des pons Varoli beruht, während ein zweiter Sohn desselben Vaters an Moral insanity, oder an Dementia paralytica, oder an Taubstummheit leidet, oder eine Tochter ausgesprochen und hochgradig hysterisch ist. Es erklärt sich ferner hieraus, wie von den Kindern einer apoplektischen Mutter, das eine an Migräne, das andere an Diabetes mellitus leiden kann; wie ein Kind später an Tabes dorsalis zu Grunde geht, ein anderes wegen geistiger Unzulänglichkeit zu Nichts in der Welt kommt. Es erklärt sich aber auch endlich daraus, wie nicht immer und unter allen Umständen

den die Fehler und Schwächen der Eltern sich auf die Kinder zu vererben brauchen; sondern wie es unter günstigen Verhältnissen dieselben gleichsam ausgemerzt werden können, indem statt der bezüglichen Hypoplasien eine mehr gleichmäßig normale Ausbildung des Gehirns und Rückenmarkes Platz greift, wie das ja glücklicherweise noch recht oft der Fall ist, und zwar geschieht dieses, wenn Vater und Mutter einander ergänzen, die negativen Eigenschaften des einen Theiles, seine Schwächen und Fehler durch entsprechende positive Eigenschaften des anderen Theiles, durch Vorzüge und Tugenden ausgeglichen werden.

Wenden wir nun diese Theorie für unsere Fälle an, so müssen wir entschieden konstatiren, daß eine ungemein reiche Erfahrung in dieser Hinsicht dieselbe durchaus nicht Lügen straft. Es ist mehr als sicher geworden durch die Erfahrung, daß gerade nicht die Eltern, sondern es können auch die Großeltern oder selbst Seitenlinien der Verwandtschaft mit Epilepsie behaftet gewesen sein, wo bei Descendenten die Krankheit ebenfalls zur Entwicklung kommt. Andererseits aber zeigt die Erfahrung auch wiederum, daß in Uebereinstimmung mit jener soeben entwickelten Theorie es durchaus nicht erforderlich ist, daß die Ascendenten an ausgesprochener Epilepsie gelitten haben; vielmehr ist die Thatfache ungemein oft zur Beobachtung gekommen, daß, wo bei den Ascendenten nur eine allgemeine Nervosität, Neigung zu längerem sich oft wiederholendem Kopfwahl mit Schwindel und Ohnmachtsanwandlungen, Migräne, Hypochondrie, Hysterie u. s. w. u. s. w. vorhanden gewesen waren, man bei den Descendenten solcher Individuen wohlausgeprägte Epilepsie sich entwickeln und ausbrechen sah. Ja Nothnagel geht sogar, und wohl mit Recht, soweit, langjährigen Neuralgien peripherer Nerven bei den Eltern eine bei den Kindern epileptieerzeugende Fähigkeit zuzuschreiben.

Für die Wichtigkeit der hereditären Belastung für die

Epilepsie in ätiologischer Beziehung hat sich auch Professor Ed. Hitzig in seiner am 13. November 1875 zu Zürich gehaltenen Antrittsrede ausgesprochen, wenn er sagt, daß man nicht durchaus unbedingt zur Fahne Darwin's zu schwören brauche und doch die Lehre vom Einfluß der Abstammung auf die Art mit der größten Entschiedenheit aufrecht halten könne. Es sei für Jeden, der da sehen wolle, unzweifelhaft nachgewiesen, daß der Hauptgrund einer ungeheuren Zahl von Geistes- und Nervenkrankheiten, insbesondere auch von Epilepsie und schwerer Trunksucht, in dem Umstande zu suchen sei, daß die Ascendenten der Befallenen an einer dieser Krankheiten gelitten hätten. So würden unendlich viele Kranke zu einer gleichsam unerschöpflichen Quelle neuer Leiden, einer Quelle, die erst versiege, wenn Selbstmord und Sterilität den unglücklichen Nachwuchs ausgerottet hätten.

In wie vielen Fällen nun für die Aetiologie der Epilepsie die hereditäre Belastung maßgebend ist, dafür mögen die Statistiken hervorragender Forscher, welche sich viel mit der Beobachtung dieser Krankheit beschäftigt haben, Zeugniß ablegen, von denen ich einige anzuführen mir erlauben werde. Moreau, dem wir die ausführlichste Zusammenstellung eigener und fremder Untersuchungen über diesen Gegenstand verdanken, geht von dem Gesichtspunkte aus, daß die meisten Krankheiten des Nervensystemes in einer gemeinschaftlichen Anlage wurzeln, welche vererbt werde, aber sich bei den verschiedenen Generationen und Individuen bald unter dieser, bald unter jener Form äußere, und er kommt durch seine Beobachtungen zu dem Auspruche, daß der Einfluß der Erbllichkeit in der großen Mehrzahl der Fälle, wo nicht in allen Fällen von Epilepsie sich nachweisen lasse; so will er in 124 von ihm beobachteten Fälle 115 mal erbliche Belastung gefunden haben. Doch dieses Resultat dürfte sicher als zu groß betrachtet werden und so groß ist das Verhältniß der erblich belasteten Fälle zu den nicht belasteten auch von andern Beobachtern

nicht gefunden worden. Leuret, der in Bezug auf die Erblichkeit nur den Zustand der Eltern berücksichtigte, fand, daß unter 106 von ihm beobachteten Epileptischen 11 waren, deren Väter oder Mütter ebenfalls epileptisch gewesen waren. Herpin fand durch seine Beobachtungen in der Privatpraxis, daß unter 243 Verwandten von Epileptischen 7 Fälle von Epilepsie vorkamen, also etwa 2,9 %, während er das Verhältniß der Gesamtbevölkerung zur Epilepsie wie 6 : 1000 oder 0,6 % berechnete, was auch entschieden für Epilepsie als Familienkrankheit spricht. Zacutus Lusitanus hat einen Epileptiker gekannt, dessen sämtliche 8 Kinder und 3 Enkel von der Epilepsie wiederum befallen wurden. Echeverria fand unter 306 von ihm selbst beobachteten Fällen 80 hereditär belastet. Derselbe Autor gibt alsdann auch an, daß in solchen Fällen die Epilepsie sehr früh, meistens vor den Jahren der Pubertät ausbreche, während Ruffel Reynolds, der nach seiner trefflichen Statistik 31 % erblich belastet fand, behauptet, sie trete in derartigen Fällen vor dem zwanzigsten Lebensjahre, nach demselben aber nicht mehr auf. Diese Erfahrung glaubt auch Nothnagel nach den von ihm gemachten Beobachtungen bestätigen zu müssen, welcher auch die weitere Beobachtung mittheilt, daß solche Patienten in früheren Jahren sehr häufig schon zur Zeit der Zahnentwicklung an Eklampsie gelitten hätten, dann aber bis zur Zeit des Ausbruches der eigentlichen epileptischen Anfälle ganz gesund, wenigstens anscheinend gewesen seien.

Was diesen Punkt in der Lehre von der Aetiologie der Epilepsie angeht, so bin ich in der Lage, hier über drei Fälle derart zu berichten, welche im Sommer-Semester 1882 in der hiesigen königl. medizinischen Poliklinik zur Beobachtung kamen und deren Veröffentlichung von dieser Stelle mir der Direktor derselben, Herr Prof. Dr. Seitz, freundlichst zu gestatten die Güte hatte.

I. Fall.

Otilie St., ein 17 jähriges gut entwickeltes und genährtes Kindermädchen gibt an, daß ihr Vater vor vielen Jahren an einem Lungenleiden nach kurzem Krankenlager gestorben sei. Ihre Mutter lebt noch und dieselbe hat, wie dieselbe selbst ausagt und was auch von Verwandten bestätigt wird, in ihrer Jugend an hartnäckiger Bleichsucht gelitten. In ihren späteren Jahren litt sie dann sehr häufig an nervöser Aufgeregtheit, wie sie sich ausdrückt, verbunden mit Schwindelanfällen und langdauerndem äußerst heftigem Kopfwch. Patientin selbst hat nach der Mutter und Verwandten Aussage zur Zeit der Zahnentwicklung an Fraisen gelitten, ist dann aber bis zum 3. Januar 1882 immer ganz gesund gewesen. Menstruiert wurde Patientin zum ersten Male in ihrem dreizehnten Lebensjahre; die Periode kehrte nie in regelmäßigen vierwöchentlichen Pausen, sondern alle 14 Tage bis drei Wochen wieder mit sehr geringem Blutverluste. Seit dem Eintritte der Menfes will Patientin mit einem bald mehr bald weniger kopiösen schleimigen Ausflusse aus den Genitalien behaftet sein, der zur Zeit noch besteht. Patientin klagt seit längerer Zeit schon über Mattigkeit in den Beinen, Herzklopfen und Athemnoth bei Anstrengungen, besonders beim Stiegensteigen, ohne diesen Erscheinungen jedoch eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

Am 3. Januar 1882 bekam Patientin nun den ersten epileptischen Anfall, welcher sich in den nächsten Tagen wiederholte. Patientin gibt an, daß sie bis zum 4. Mai, an welchem Tage sie in die Behandlung der kgl. medizinischen Poliklinik dahier eintrat, siebzehn derartige Anfälle gehabt zu haben, den letzten am 1. Mai. Nach Aussage der Patientin empfand dieselbe einige Zeit vor den Anfällen Uebelkeit, welcher einige Male Erbrechen folgte, dann bekam sie Schwindel und unter Verlust des Bewußtseins, fiel sie alsdann meist vornüber zu Boden wie ihre Umgebung ausagt, wobei dann

die Extremitäten in konvulsivische Zuckungen gerathen und Schaum vor den Mund der Kranken tritt; auch zerbeißt sie sich im Anfall oft die Zunge, wovon deutliche Spuren wahrnehmbar sind. Die Bewusstlosigkeit dauerte bei den ersten Anfällen ungefähr eine Viertelstunde, später jedoch nur mehr sechs bis acht Minuten.

Die objektive Untersuchung der Kranken ergab eine gut entwickelte Muskulatur und panniculus adiposus; Zeichen einer früher bestandenen Rachitis waren nicht aufzufinden. Die sichtbaren Schleimhäute zeigen eine ziemliche Blässe; Athmung war normal, Puls ziemlich klein und etwas beschleunigt; der Spitzenstoss des Herzens ist in der Mammillar-Linie im vierten Interkostalraum zu fühlen. Die Perkussion des Herzens ergibt keine Verbreiterung nach irgend einer Richtung; die Auskultation läßt ein systolisches Geräusch, am lautesten an der Herzspitze hörbar, vernehmen; Aortentöne rein; zweiter Pulmonalton nicht verstärkt. An der rechten vena jugularis ist sehr deutlich ein bruit de nonne wahrnehmbar. Die Auskultation und Perkussion der Lungen ergeben normale Verhältnisse; auch sonst ist bis auf die bestehende mässige Leucorrhoe nichts Pathologisches zu finden. Patientin hat nie eine Verletzung erlitten und weifs für die Entstehung ihrer Anfälle gar keinen Grund anzugeben; auch weifs sie nicht anzugeben, dafs durch irgend welche Verhältnisse der Ausbruch der Anfälle begünstigt oder verhindert werden könne.

Die Anfälle sind somit ohne Zweifel als epileptische zu bezeichnen. In Anbetracht der Blässe der äufseren Haut und der sichtbaren Schleimhäute, des accidentellen Herzgeräusches, des ausgesprochenen Geräusches an der Jugularis, der unregelmässigen spärlichen Menfes und des seit Eintritt derselben bestehenden Fluor albus, der subjectiven Klagen der Patientin über Herzklopfen, Athemnoth und rascher Ermüdung, besonders bei Anstrengungen und Treppensteigen ist fernerhin die Diagnose auf Chlorose mit Sicherheit zu stellen.

Die Patientin bekam deshalb Eisen und Sol. Kal. brom. 10,0:200,0 3 $\times$ tgl. 1 Eßlöffel voll verordnet.

Als die Patientin sich nach ungefähr sechs Wochen am 15. Juni wieder in der Poliklinik vorstellte, hatten sich ihre subjektiven Beschwerden schon wesentlich gebessert; ihr Aussehen war blühender und frischer und sie hatte, seitdem sie Bromkalium genommen, auch nicht einen einzigen epileptischen Anfall mehr gehabt. Es wurde nun das Bromkali ausgesetzt, Eisen aber noch weiter zu nehmen verordnet. Auch jetzt nach dem Aussetzen des Bromkalium hatte Patientin bis zum 18. Juli, an welchem Tage ich sie zum letzten Male sah, keinen Anfall mehr gehabt. Ob die Heilung eine dauernde sein wird, kann natürlich mit Sicherheit nicht entschieden werden.

Prüfen wir nun diesen Fall in Bezug auf seine Aetiologie, so muß man meines Erachtens hier die erbliche Belastung als aetiologisches Moment in den Vordergrund rücken. Dafs eine hereditäre Belastung hier vorliegt, muß man nach den in der Anamnese gegebenen Daten über die Mutter und nach all' den vorhergeschickten Erörterungen als unzweifelhaft annehmen. Bei dem Fehlen jedes sonstigen ätiologischen Momentes muß man hier annehmen, dafs die Epilepsie hereditär bei unserer Patientin veranlagt war und wie ich meine, hat die sich immer weiter sich entwickelnde Chlorose seit Eintritt der Menfes den Ausbruch der epileptischen Erscheinungen veranlaßt, wofür meines Erachtens auch der Umstand spricht, dafs, sobald die Chlorose durch die Therapie gebessert wurde, auch die Anfälle ausblieben, wobei ich aber durchaus die günstige Wirkung des Bromkalium als unterstützend nicht in Abrede stellen will.

II. Fall.

Otto B., ein 32 Jahre alter, lediger Schlossergefelle von München, dessen Vater im Alter von 52 Jahren an Apoplexie zu Grunde gegangen ist, dessen Mutter noch lebt und welche nach ihrer eigenen Aussage als junges Mädchen an heftiger Bleichfucht und sehr intensivem halbseitigem Kopfschmerze, der

auch in den späteren Jahren von Zeit zu Zeit immer wieder recidivirt hat, gelitten hat, gibt an, daß er in der Kindheit die Fraisen gehabt habe. Später in den Schuljahren habe er oft einen eigenthümlichen Schwindel, verbunden mit einem Angstgefühle, bekommen, welche Erscheinungen sich aber im Laufe der Jahre allmählig verloren hätten. Sonst war er immer ganz gesund, bis er vor 10 Jahren, also mit 22 Jahren, an ausgesprochenen epileptischen Krämpfen erkrankte, welche anfangs nur des Nachts sich einstellten, später jedoch auch am Tage, häufig zweimal und öfter. Er gibt an, daß manchmal den Anfällen keine deutliche Aura vorangehe, in der Regel aber verspüre er als Zeichen eines herannahenden Anfalles das Gefühl des Zusammenziehens in der Magengegend; dann werde er bewußtlos und stürze zu Boden. Seine Mutter berichtet, daß dann sehr starke konvulsivische Zuckungen eintreten, wobei die Gesichtsmuskulatur sich mehr oder weniger heftig verzerre und nach und nach würden dann die Gliedmaßen krampfhaft steif. Die Dauer eines Anfalles sei verschieden, bald dauere er eine halbe Stunde, bald gehe er früher, bald später zu Ende. Patient selbst gibt dann an, daß er nach dem Anfälle eine große Mattigkeit und Abgeschlagenheit in allen Gliedern verspüre. In der anfallfreien Zeit fühlt Patient sich wohl und gesund, nur hat sein Gedächtniß seit Beginn der Krankheit, wie er ausdrücklich angibt, sehr gelitten; auch sei er häufig psychisch verstimmt. Trotz der Behandlung mit Bromkali schon seit geraumer Zeit hat sich keine Besserung erzielen lassen, im Gegentheile treten in letzter Zeit die Anfälle noch heftiger auf, so daß Patient einmal durch Fall gegen einen Ofen sich eine ziemliche Kopfverletzung zugezogen hat; es wird deshalb, zumal in neuester Zeit auch maniakalische Zustände sich einstellen, die Ueberbringung in eine geeignete Anstalt durchaus nöthig, wodurch der Fall allerdings der weiteren poliklinischen Beobachtung verloren ging. Die Untersuchung der körperlichen Organe hatte durchaus ein negatives Resultat.

Auch in diesem Falle ist in ätiologischer Beziehung für die Entwicklung der Krankheit zweifelsohne die hereditäre Belastung Seitens der Mutter des Patienten, wie die Anamnese ergibt, maßgebend gewesen. Die eigenthümlichen Schwindelgefühle, welche Patient schon in früheren Jahren gehabt haben will, sind, wie ich glaube, auch schon als epileptoider Zufälle im Sinne Griesinger's aufzufassen, oder als sogenanntes petit mal der Franzosen, und wahrscheinlich haben diese auch die psychische Erkrankung, wie sie sich in der deutlich vom Patienten selbst wahrgenommenen Gedächtnisschwäche und der zeitweisen psychischen Verstimmung und Gemüthsdepression dokumentirt, zur Folge gehabt, da ja die Prognose in Bezug auf spätere psychische Erkrankung bei diesen epileptoiden Zuständen, dem petit mal äußerst ungünstig ist, welcher Ansicht auch Obermedizinalrath Prof. Dr. von Gudden nach seinen Erfahrungen beipflichten zu müssen glaubt. Auch die Wirkungslosigkeit des Bromkali im vorliegenden Falle scheint hierfür zu sprechen, da die Erfahrung gezeigt hat, daß Bromkali in solchen Fällen fast immer keine sonst so günstige Wirkung verfaßt.

Noch über einen dritten Fall will ich berichten, bei dem beide Eltern an Epilepsie gelitten hatten und die Tochter ebenfalls epileptisch wurde, wo also auch die Krankheit unbedingt hereditär veranlagt war.

III. Fall.

B. Magdalene, 45 Jahre alte Tagelöhnersfrau, leidet seit ihrem zwanzigsten Lebensjahre an epileptischen Krämpfen. Patientin gibt an, daß sowohl ihr Vater, als auch ihre Mutter, welche übrigens an einer ihr unbekannten Todesursache gestorben sind, an eben solchen Krämpfen gelitten hätten, wie sie sich deutlich erinnere. Patientin, ein sehr anämisches und hyperästhetisches Individuum hat mit neun Jahren einen akuten Gelenkrheumatismus durchgemacht, als dessen Folgezustand wohl die jetzt bestehende Mitralinsuffizienz zu betrachten ist.

Die Menfes traten zum ersten Male im achtzehnten Lebensjahre ein, dann cessirten dieselben bis zum zwanzigsten; die Kranke will damals sehr bleichsüchtig gewesen sein. Die Menfes waren auch in der Folgezeit äußerst unregelmäßig, dabei aber sehr abundant. Patientin hat achtmal geboren und zweimal im dritten Monat abortirt; alle Kinder sind bis auf eine Tochter, welche ikrophulös ist, gestorben. Mit 20 Jahren trat der erste epileptische Anfall ohne deutliche Vorboten mit vollständigem Verluste des Bewusstseins ein; die Anfälle kehren in acht bis neunwöchentlichen Pausen wieder, besonders nach dem Genuß von ungewohnten Speisen und zur Zeit der Periode. Die Anfälle dauern ungefähr 10 bis 15 Minuten; das Gesicht wird cyanotisch, die konvulsivischen Zuckungen aber treten vornehmlich an der rechten Körperhälfte auf. Die Kranke gibt an, daß sie niemals während ihrer wiederholten Schwangerschaften einen Anfall gehabt habe; Erschrecken begünstige den Ausbruch der Anfälle. Schließlich sei in Bezug auf Heredität in dieser Sache noch erwähnt, daß bei Kindern, welche einer Ehe zwischen Blutsverwandten entsprossen sind, wie andere Nervenkrankheiten, als Retinitis pigmentosa, Taubstummheit, Hydrocephalus congenitus, auch häufig Epilepsie zur Beobachtung gekommen ist, was nach der Arndt'schen Theorie über Vererbung ja auch sehr leicht sich erklärt.

So sicher man die hereditäre Belastung als ätiologisches Moment für die Entstehung der epileptischen Veränderung betrachten kann, um so vorsichtiger muß man bei der Beurtheilung aller anderen den Gesamtorganismus oder das Gesamtnervensystem betreffenden Einflüsse, anatomisch nicht erkennbaren Natur, als ätiologische Momente sein.

Es sind zu allen Zeiten und von allen Beobachtern allerlei Einflüsse in dieser Richtung beschuldigt worden, wovon die interessante Tabelle von Moreau, welche Haffé in Virchow's Handbuch der Pathologie und Therapie Band IV. 1. 1835

Zeugnifs gibt, während dieselben neuerdings nur als das die Anfälle veranlassende Agens betrachtet werden.

Doch wie dem auch sei, es steht unzweifelhaft fest, dafs es gewisse Einflüsse gibt, denen man eine die epileptische Veränderung hervorrufende Wirkung nicht wohl abstreiten kann.

In erster Linie gehört hierher der *abusus spirituosorum*. Potatoren bieten abgesehen von den sonstigen oft sehr schweren Folgeerscheinungen des Alkoholmissbrauches häufig ganz eklatante Typen. Auch Arndt, der allerdings kurz vorher sagt, dafs epileptische, beziehungsweise epileptoide, oder auch blos zu solchen Zuständen hinneigende Naturen dem Alkoholismus verfielen, — denn, dafs ganz gesunde Menschen, wenn ihnen nicht Zwang angethan würde, je Alkoholisten würden, das bedürfe noch gar sehr des Beweises, — erklärt, dafs Alkoholismus gar nicht so selten zu ausgesprochener Epilepsie führe, welche, soweit nachzuweisen, ganz allein durch ihn hervorgerufen worden, ihm entsprossen sei, welche aber ein ganz besonderes psychisches Gepräge an sich trüge, ähnlich dem des Alkoholisten selber, welcher nicht epileptisch erkrankte. Was die Häufigkeit dieser durch Alkoholmissbrauch hervorgerufenen Epilepsie anlangt, so glaubt Arndt, dafs 10 % aller Fälle von Epilepsie wahre Alkoholepilepsien seien. In welcher Weise durch den Alkohol die epileptische Veränderung bewirkt wird, darüber habe ich nirgends eine Ansicht finden können, ebensowenig wie es bekannt ist, wie eine Amaurose nach Alkoholmissbrauch, durch Nicotin, Chinin- und Blei-Intoxikation sich entwickeln kann. Bemerkenswerth ist auch noch der Umstand, dafs die Descendenten von Trunkenbolden, wie Hitzig mittheilt, sehr häufig die gleiche, wenn nicht eine gröfsere Disposition zu Erkrankungen des Nervensystemes erben, als die Kinder von nervösen oder sonst geisteskranken Eltern, ja, dafs sie noch häufiger an Konvulsionen und andern epileptiformen Zuständen in frühester Jugend zu Grunde gehen.

Es ist nun nicht gesagt, dafs der erste epileptische Anfall

gerade während oder unmittelbar nach einem Rausche ausbrechen muß, obgleich auch Fälle dieser Art bekannt sind, sondern sehr häufig kommt derselbe gerade dann zum Ausbruch, wenn aus irgend einem Grunde der *abusus spirituosorum* aufgegeben werden mußte, und Mäßigkeit und Enthaltensamkeit an dessen Stelle trat, wofür ich jedoch eine Erklärung weder finden noch geben kann. Man hat es nun in solchen Fällen nicht immer mit ausgesprochener Epilepsie, dem hauptmal der Franzosen, sondern hier kommen gerade häufig die unter dem Namen der epileptoiden Anfälle bekannten Krankheitsformen zur Beobachtung.

Auch hier in der medizinischen Poliklinik kamen im Sommer-Semester 1882 drei Fälle dieser Art zur Beobachtung, über welche ich hier in aller Kürze berichten will.

IV. F a l l.

Georg Sp., ein 47 Jahre alter Tagelöhner aus Bogenhausen bei München, dessen Eltern in hohem Alter gestorben und bis an ihr Ende stets gesund gewesen sein sollen, gesteht ein, in früheren Jahren ein sehr starker Biertrinker gewesen zu sein, ohne daß er dabei dem Branntwein abhold gewesen wäre, bis er vor einiger Zeit durch Noth gezwungen, dem *Potatorium* habe entfallen müssen. Er bekam dann epileptoide Anfälle, welche er folgendermaßen schildert: zunächst werde er schwindlich, so daß er sich nicht mehr auf den Füßen halten könne und sich stützen oder niedersetzen müsse, wenn er nicht umfallen wolle. Dabei umnebele sich sein Bewußtsein und er wisse nicht mehr recht, was mit ihm vorgehe, nur spüre er, daß seine Hände und Füße in zitternde Bewegungen geriethen. Diese Zufälle sollen $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde andauern und sich einige Male im Monat wiederholen. Manchmal spüre er, wenn der Anfall im Anzuge sei, einen Druck in der Magengrube. Im Uebrigen bietet Patient keine weiteren pathologischen Störungen und will derselbe bis auf einen Typhus, den er in den

Jugendjahren durchgemacht hat, stets vollkommen gesund gewesen sein, besonders nie früher an derartigen Anfällen gelitten haben.

V. Fall.

Ein anderer Fall betrifft einen 34 Jahre alten Knecht Johann R. von München. Der Vater des Patienten ist an Lungenschwindfucht, die Mutter in hohem Alter an unbekannter Todesursache zu Grunde gegangen. Die Frage, ob Geistes- oder sonstige Nervenkrankheiten in der Familie vorgekommen oder vorhanden sei, wird verneint, so daß erbliche Belastung als vollkommen ausgeschlossen zu erachten ist. Patient ist immer stets gesund gewesen; von Kinderkrankheiten hat er die Masern durchgemacht. Derselbe gesteht ein, früher ein sehr starker Trinker gewesen zu sein, sei aber in letzter Zeit wieder mäßiger geworden. Seit dieser Zeit bekomme er eigenthümliche Anfälle, die nach seiner Beschreibung als epileptische aufgefaßt wurden. Patient erzählt, daß er, wenn er einen solchen Anfall bekomme, welche sich übrigens sehr häufig in der Kirche einstellen oder wenn er in einem recht heißen und dunstigen Lokale sich aufhalte, das Gefühl habe, als steige ihm Etwas aus dem Unterleibe gegen den Hals auf; er werde alsdann schwindlich, fange am ganzen Körper heftig an zu zittern, verliere das Bewußtsein nicht immer vollständig, sondern glaube sich wie in einem Traume befangen, was einige Zeit andauere, dann fühle er sich wieder wohl. Andere ätiologische Momente, als das bestandene Potatorium, sind durch genaue Nachfrage nicht zu eruiiren.

VI. Fall.

In den letzten Tagen des Juni 1882 kam der 63 jährige Tagelöhner Xaver E. in die hiesige medizinische Poliklinik mit der Angabe, daß er vor fünf Tagen schwindelartige Anfälle bekommen hätte, wobei er am ganzen Körper in konvulsivische

Zuckungen gerathen sei und dann sei er bewußtlos geworden; derartige Anfälle hätten sich seitdem mehrfach wiederholt. Patient gibt an, daß er von seinem 24. Lebensjahre, wo er in Brauereien als Knecht gearbeitet habe bis vor Kurzem große Quantitäten Bier getrunken habe, oft des Tages über 15—20 Liter, wobei er jedoch bis auf etwas Husten immer ganz gesund gewesen sein will und seinen Verpflichtungen immer habe nachkommen können. Daß seine Eltern, die ein hohes Alter erreicht haben sollen, oder andere Glieder seiner Verwandtschaft an ähnlichen Anfällen gelitten, oder Geisteskrankheiten in der Familie vorgekommen seien, wird in Abrede gestellt. Im Uebrigen ergab die Untersuchung des Patienten chronische Bronchitis mit Bronchiectasien und ziemlich bedeutende Atheromatose der Gefäße. Die Anfälle wurden als epileptoide bezeichnet und ihre Entstehung dem übermäßigen Biergenusse des Patienten zugeschrieben.

Endlich sei in dieser Beziehung noch erwähnt, daß man auch versucht hat, durch fortgesetzte Alkoholeinfuhr bei Thieren Epilepsie zu erzeugen, auf welchem Gebiete der Forschung besonders Magnan thätig gewesen ist. Diese Versuche aber haben bis jetzt ein negatives Resultat ergeben; vielleicht liefert die Zukunft noch brauchbare.

Wenn weiterhin früher mehr oder weniger alle Erkrankungen des Centralnervensystemes, besonders des Rückenmarkes, ohne Weiteres auf Excesse in venere oder auf Masturbation zurückgeführt wurden, so wurde auch die Epilepsie häufig als in geschlechtlichen Ausschweifungen begründet aufgefaßt. Doch ist man in neuerer Zeit diesen alten Anschauungen, welche an dem Causalnexus zwischen Erkrankungen des Nervensystemes, ich erinnere z. B. nur an die in so üblem Geruche stehende *Tabes dorsalis*, und Ausschweifungen dieser Art festhielten, sehr skeptisch entgegengetreten, und so auch in der Lehre von der Aetiologie der Epilepsie. Denn einerseits hat sich durch die Beobachtung ergeben, daß die Häufigkeit

jener Exceſſe in viel zu ſchroffem Gegenſatze zum Vorkommen der Krankheit, zumal es für dieſelbe meistens viel evidentere Urfachen gibt, ſteht, andererseits ſo iſt, wenn irgendwo, ſo hier Urfache und Wirkung mit einander verwechſelt werden und ſo gern und leicht der Satz angewendet worden: *post hoc, ergo propter hoc*. Und Arndt wird Recht haben, wenn er ſagt, daſs das, was vorzugsweiſe auf eine ſchon ſchiefe Anlage, eine angeborene oder gar ererbte Dispoſition, weil auf vorhandene Paraeſtheſien und Parabulien zu ſchieben war, allein auf ſexuelle Exceſſe und in Sonderheit auf Onanie geſchoben worden iſt. So hat ja auch die Erfahrung gelehrt, daſs Epileptiker dann erſt ſich derartigen Ausſchweifungen hingeben, nachdem ſie bereits erkrankt ſind, während früher in den Tagen der Geſundheit nichts derartiges bei ihnen wahrzunehmen war.

Nothnagel behauptet, daſs er nur in einem einzigen ſeiner zahlreichen beobachteten Fälle die Epilepſie auf Maſturbation habe zurückführen können.

Ebenſo vorſichtig muſs man im Allgemeinen mit ſeinem Urtheile ſein in den Fällen, wo für das Zuſtandekommen der Epilepſie als ätiologiſche Momente angeſtrengte geiſtige Arbeit, langdauernde deprimirende Gemüthsaffekte, Kummer, unglückliche Liebe und dergleichen angeſprochen werden. Nur in Betreff der angeſtrengten geiſtigen Arbeit möchte ich noch einige Worte bemerken.

Wenn es wahr iſt, daſs Psychoſen gerade am häufigſten in der gebildeten Menſchenklaſſe, inſondere wieder unter Gelehrten, Männern, die ihre ganze phyſiſche und moralische Kraft ihrem Studium und ihren Forſchungen gewidmet haben, und die Epilepſie doch in ſo naher Beziehung zu den Psychoſen ſteht, ſo iſt doch wohl anzunehmen, daſs dieſelbe Urfache auch dieſe wohl gegebenen Falles hervorgerufen habe.

Was nun die Frage angeht, ob Scrophuloſe und Rachitis und überhaupt eine mangelnde und unzureichende Ernährung

ätiologisch für die Entstehung der Epilepsie wichtig seien, so hat neuerdings wieder der Engländer Anstie und ausser anderen älteren Beobachtern z. B. Moreau auch Echeverria die Ansicht ausgesprochen, dass diese Ernährungsanomalien, insbesondere auch mangelhafte und unzureichende Ernährung recht wohl den Boden für die Entwicklung der epileptischen Veränderung abgeben können. Und sicher sind in dieser Beziehung, was auch Haffs ausdrücklich hervorhebt, hierher zu rechnen jene mannigfaltigen Störungen der Ernährung, die man kurzweg als Anämie und Chlorose bezeichnet. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass diese letzteren Störungen, so oft sie auch eine grosse ätiologische Bedeutung haben, oft auch erst im Verlaufe der Krankheit sich ausbilden, also auch eine Folge der Epilepsie seien, was wiederum Haffs betont. Doch die meisten Autoren haben der Chlorose und der Anämie überhaupt die Stellung zugesprochen, dass sie in den Fällen wo die Epilepsie, oder präziser ausgedrückt, die epileptische Veränderung, sei es durch welche Umstände bedingt, schon vorhanden war, den Ausbruch der epileptischen Anfälle hervorriefe. Dies mag ja in vielen Fällen gewiss richtig sein; jedoch widerspricht es weder den Experimentalstudien und ihren Resultaten über das Wesen der Epilepsie, noch den physiologischen Thatfachen, dass auch durch Chlorose und Anämie die Entwicklung der epileptischen Anämie zu Stande komme. Das Gehirn, als der feinste und zarteste Theil des ganzen thierischen Organismus, bedarf zu seiner Entwicklung sowohl, als auch zur Entfaltung seiner harmonischen Funktionen einer ganz normalen Blutmischung; wird diese geändert, machen sich sofort Störungen bemerkbar. Da nun nach den früher mitgetheilten Versuchen von Kufsmaul und Tenner Epilepsie erzeugt werden kann durch Anämie des Gehirns, und später Landois, sowie Hermann und Escher dasselbe für Hirnhyperämie nachwiesen, ferner Landois diese Erscheinungen als auf Störungen im normalen Gasgehalte der rothen Blut-

zellen an Sauerstoff resp. Kohlenfäure beruhend erklärte, so ist es doch nicht undenkbar, daß durch eine länger dauernde Chlorose, bei der doch auch wesentlich die Verminderung des Hämoglobins in den rothen Blutzellen maßgebend ist, wodurch doch auch der normale physiologische Gasgehalt des Blutes gestört wird, jene Zustände im Centralorgane sich entwickeln können, welche man als epileptische Veränderung bezeichnet. Wie das vor sich geht, darüber kann man allerdings noch nichts Wesentliches und Bestimmtes ausagen.

Ich theile hier einen Fall mit, bei dem die Epilepsie sich wahrscheinlich auf Grund von Scrophulose und Rachitis entwickelt hat, was man um so eher annehmen zu müssen glaubte, als alle sonstigen ätiologischen Momente fehlen.

VII. Fall.

Wally St., Köchin, 25 Jahre alt, deren Eltern noch leben und sich einer guten Gesundheit erfreuen und in deren Verwandtschaft, so weit es sich durch Anamnese feststellen läßt, Geistes- und Nervenkrankheiten nicht zu Haufe sind, will als Kind von 4 Jahren Scharlach mit nachfolgender Nierenentzündung und allgemeiner Wässerfucht überstanden haben; im 17. Lebensjahre Rippenfellentzündung, im 18. Typhus. Außerdem gibt Patientin an, daß sie seit ihrer Jugend viel an Drüfenschwellungen und Vereiterungen leide, wovon noch zahlreiche Narben sichtbar sind, und sie soll, nach Aussage ihrer Mutter, in der Jugend an der englischen Krankheit gelitten, und das Gehen sehr spät erlernt haben. Mit 21 Jahren wurde Patientin zum ersten Male menstruirt; die Periode war immer sehr schwach und von kurzer Dauer; anfangs war dieselbe regelmäsig, in letzter Zeit dagegen sehr unregelmäsig. Patientin hat zweimal geboren und einmal im zweiten Schwangerschaftsmonat abortirt; im letzten Wochenbett will Patientin eine heftige Mastitis durchgemacht haben. Im 5. Lebensjahre traten zum ersten Male epileptische Anfälle, wie sie von dem damals

behandelnden Ärzte bezeichnet worden seien; dieselben hätten manchmal ein bis anderthalb Jahre ausgesetzt, seien aber in der Regel in kürzeren Intervallen bis zur letzten Entbindung im Juni 1881 wiedergekehrt. Seit dieser Zeit will Patientin ungefähr 50—60 Anfälle gehabt haben. Sie trat deshalb, nachdem sie schon verschiedene Male ohne Erfolg behandelt war, anfangs Mai 1882 in die Behandlung der kgl. medizinischen Poliklinik dahier mit der Angabe, in letzter Woche sieben Anfälle gehabt zu haben. Patientin erzählt, daß sie vor jedem Anfalle ein Druckgefühl in der Magengegend verspüre; sie werde alsdann unter Zittern und Schütteln der Extremitäten schwindlich und dann bewußtlos. Ihre Mutter erzählt dann, daß sie meist rückwärts zu Boden stürze und die Bewußtlosigkeit dauere meist $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunden. Zweimal hatte ich Gelegenheit, die Patientin in ihrer Wohnung während eines Anfalles zu beobachten und fand die Schilderung der Anfälle der Wirklichkeit entsprechend. Patientin will bemerkt haben, daß in der ersten Hälfte ihrer Schwangerschaften die Anfälle an Häufigkeit und Heftigkeit zugenommen hätten, in der zweiten Hälfte dagegen ganz und gar ausgeblieben seien. Daß die Zeit der Menfes oder sonst ein Umstand für den Ausbruch der Anfälle von Belang gewesen sei, weiß Patientin nicht anzugeben. Der Kranken wurde Bromkalium verordnet und nach etwa sechswöchentlichem Gebrauche hatten die Anfälle erheblich an Zahl und Intensität abgenommen. Der weiteren Beobachtung entzog sich die Kranke durch Verlassen hiesiger Stadt.

Soviel in dieser Beziehung. Wenden wir uns nun zu den Fällen, bei welchen nach Nothnagel die epileptische Veränderung durch eine bestimmte anatomische Läsion des Nervensystemes hervorgerufen ist, so stehen wir hier auf einem ungleich sichereren Boden, als bei den vorhin besprochenen Fällen, weil wir hier viel besser an der Hand der physiologischen Thierexperimente die Krankheitserscheinungen analysiren und erklären können.

Wie ich oben schon erwähnt habe, hat Nothnagel und mit ihm alle neueren Autoren und Kliniker den Begriff der Reflexepilepsie aufrecht erhalten, während der um die Erforschung des Wesens und der Heilung der Epilepsie so sehr verdiente Ruffel Reynolds diese Form einfach unter den Begriff der Krämpfe subsummiren wollte, wie früher des Näheren auseinandergesetzt worden ist, und worauf ich hier wieder verweise.

Nothnagel ist nun der Ansicht, daß durch den Reiz und die Erregung, welche von einer bestimmten lädirten Stelle des Nervensystems unaufhörlich ausgehe und auf das Gehirn wirke, die epileptische Veränderung in demselben hervorgerufen werden könne, wie Brown-Séquard es ja unzweifelhaft durch seine Thierexperimente nachgewiesen hat, welche ich anfangs mitgetheilt habe. Was nun diese peripheren Nervenläsionen angeht, so sind es meistens der Ischiadicus oder der Trigemini, welche gewöhnlich durch ein Trauma, seltener durch den Druck von Tumoren oder Neubildungen in Erregung versetzt werden. Viele Fälle sind in dieser Beziehung schon in der Literatur veröffentlicht worden, ich möchte hier nur an den Fall erinnern, den Geheimrath Prof. Dr. Ritter von Nufsbaum hier in München beobachtet hat, wo die Epilepsie seit 9 Jahren bestanden hatte, und den derselbe durch Nervendehnung vollständig geheilt hat. (Vergl. die Inaugural-Dissertation von Dr. Tutschek. München 1875.) Ferner sei es mir gestattet auf den Fall von Panas aufmerksam zu machen, über welchen Notizen in Nr. 103 der allgemeinen medizinischen Central-Zeitung 50. Jahrgang 1881 erschienen. Es handelt sich hier um einen Mann, dem vor 4 Jahren bei einem Streite ein Messer in die linke Hüfte gestochen wurde, wobei der nervus ischiadicus verletzt wurde, worauf die Muskeln des Oberschenkels und Fußes gelähmt wurden und die Haut an derselben Extremität die Sensibilität verlor. Nach einigen Monaten stellte sich bei dem Manne eine Reflexepilepsie ein,

welche auch durch Dehnung des verletzten Nerven nach seiner Heilung zum Verschwinden gebracht wurde. Auch von Hautnarben aus kann ein solcher Reiz unterhalten werden, wie die zwei Fälle von Schell beweisen, welche derselbe in einer Monographie veröffentlicht hat.

Hierher gehören ferner die Fälle, wo die Krankheit von pathologischen Veränderungen im Sexualapparate bei Frauen angeregt wird, wenn in dieser Beziehung auch vielfach zu weit gegangen worden ist, ebenso gut wie Neuralgien in andern Nerven vom Genitalapparate aus bei Frauen angeregt und unterhalten werden, wie Prof. Holst in Dorpat im vorigen Jahre einen derartigen Fall in Nr. 6 der allgemeinen Wiener medizinischen Zeitung mittheilt, wo eine zwölf Jahre lang bestehende Neuralgie des Quintus von einer Erkrankung der portio vaginalis uteri ausgegangen war und sofort verschwand, nachdem dieselbe amputirt worden war.

Wenn Nothnagel dann ferner noch behauptet, daß die rein funktionellen Vorgänge in den betreffenden Centraltheilen, welche bei den Zahnkrämpfen der Kinder vorkommen, den Anstoß zur Entwicklung der epileptischen Veränderung abgaben, so muß man dies fallen lassen, wenn man Eklampsie und Epilepsie für dieselben Krankheitsprozesse im Sinne Arndts hält und die erstere nur als die akute Form der letzteren auffaßt.

Bisher war nun nur von Läsionen sensibler oder gemischter Nerven die Rede, ob auch Läsionen rein motorischer Nerven denselben Effekt haben, darüber ist die Entscheidung noch nicht gefallen, obwohl, wie Nothnagel angibt, einige Beobachtungen dafür zu sprechen scheinen.

Eine wichtige Rolle in der Lehre von der Epilepsie spielen alsdann die traumatischen Schädelverletzungen mit oder ohne Affektionen der Hirnsubstanz selber, nach denen man so häufig Epilepsie zur Entwicklung kommen sieht. In klinischer Beziehung bezweifelt man die Wichtigkeit derartiger Verletzungen

für die Aetiologie unserer Krankheit durchaus nicht mehr, nachdem ja Westfal und Hitzig so glänzend den experimentellen Beweis für die Richtigkeit dieser Anschauung am Versuchsthiere erbracht haben, den ich oben auch erwähnt habe.

Es kommen allerdings hier von den traumatischen Infulten, welche den Schädel treffen, nur diejenigen in Betracht, welche eine äußerlich wahrnehmbare Läsion nicht hinterlassen, da diese ja in die vorhin besprochene Kategorie gehören, Und wenn Bergmann¹⁾ also in dieser Beziehung folgende drei Gruppen aufstellt:

1. Fälle, welche von Wunden der weichen Schädeldecke ausgehen. (Nach Zeller's Erfahrungen führen diese Wunden häufiger zur Epilepsie, als die Verletzungen der Weichtheile anderer Gegenden).

2. Fälle, welche von Wucherungen der Schädelknochen, eventuell von Frakturen oder deprimirten Schädelstücken ausgehen; bei diesen ist nach Hüter die Trepanation des betreffenden Knochenstückes sehr indiziert.

3. Fälle solcher Art, welche von Verletzungen des Gehirns und besonders der Rinde des Gehirns, natürlich durch Infulte, welche den Schädel treffen, Schlag, Stofs, Fall etc. bedingt, ausgehen, so ist für unsere Besprechung nur die zweite und dritte Gruppe maßgebend. Fälle dieser Art sind nun manche in der Literatur verzeichnet und einen recht interessanten erzählt Nothnagel in seiner Abhandlung über die Epilepsie in Ziemsen's Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Vielleicht liefert auch folgender Fall aus der hiesigen medizinischen Poliklinik in dieser Richtung ein Beispiel.

VIII. Fall.

Josef H., 54 Jahre alt, früherer Wirth von München, gibt an, daß sein Vater im 87., die Mutter im 65. Lebensjahre,

¹⁾ Hüter, Grundriß der Chirurgie, II. S. 36.

beide an einer ihm unbekannten Todesursache gestorben seien. Die Frage, ob Geistes- oder Nervenkrankheiten in seiner Familie vorgekommen seien, wird verneint; ebenso ganz entschieden Potatorium. Mit sieben Jahren hat Patient einen Typhus durchgemacht und war dann bis zum 18. Lebensjahre vollkommen gesund, wo er das Unglück hatte, von einer Leiter zu stürzen und heftig mit dem Hinterhaupte auf den Boden aufzuschlagen, ohne dabei sich jedoch eine Verletzung der weichen Schädeldecken oder einen Bruch der Schädelknochen zugezogen zu haben. Einige Wochen nach diesem Falle bekam Patient jedoch epileptische Anfälle, welche sich in Intervallen von einigen Wochen oder Monaten, ja Jahren wiederholt haben. Am 1. Mai 1882 hatte Patient den letzten Anfall; derselbe kam, wie die übrigen, plötzlich ohne Vorboten, wobei er unter Zuckungen und Krämpfen zu Boden fiel und bewusstlos wurde. Die Untersuchung des Schädels ergab nur zwei kleine höckerige Erhabenheiten am Hinterhaupt, welche nach jenem Falle sich allmählig gebildet haben sollen. Sonst bietet Patient keine weiteren pathologischen Veränderungen irgend welcher Art dar, und die Entstehung seiner unzweifelhaft epileptischen Anfälle wurde gewiss mit Recht auf jenen unglücklichen Sturz zurückgeführt.

Nach Nothnagel gibt es nun noch unzweifelhaft Fälle, in welchen eine cirkumskripte Heerderkrankung im Gehirn zum Ausgangspunkt der Epilepsie wird, die Entwicklung der epileptischen Veränderung im verlängerten Marke anregt. So sind nach ihm besonders Rindenaffektionen, natürlich nicht traumatischer Natur, in dieser Beziehung bedeutungsvoll, und es ist ein schon lange bestätigter Satz, daß bei Individuen, bei deren Obduktion man Tumoren der Convexität fand, intra vitam oft Epilepsie beobachtet wurde; manche dieser Fälle mögen allerdings wohl nur zu der symptomatischen Epilepsie, welchen Begriff man ja wieder hat fallen lassen, zu rechnen gewesen sein.

Auch bei Leuten, welche an *Dementia paralytica* litten, sind oft epileptiforme Anfälle beobachtet worden, welche Westphal ¹⁾ durch einen sekundären Prozeß im Pons resp. medulla oblongata, nicht direkt durch Rinden oder Ventrikel-Läsion bedingt hält.

Für alle derartigen Fälle muss man nun, wie Nothnagel betont, annehmen, daß die ursprüngliche Läsion, analog den peripheren Nervenverletzungen, sekundär zur Entwicklung der epileptischen Veränderung geführt habe, wobei das Wie sich allerdings vor der Hand unserer Kenntniss und Einsicht vollständig entziehe.

Ob in Folge eines Rückenmarksleidens sich auch im Gehirn die epileptische Veränderung entwickeln könne, bejahen einige Autoren, während unter andern z. B. Leyden diese Frage verneint.

Nun gibt es aber schliesslich noch ganz unzweifelhafte Fälle, für deren Entstehung sich in ätiologischer Beziehung durchaus keine Urfachen vorhin besprochener Natur ausfindig machen lassen und deren Entstehung zu erklären vor der Hand nichts anderes übrig bleibt, als zu erklären, daß die Epilepsie sich auch spontan, ohne irgend welche bis jetzt bekannte veranlassende Momente entwickeln könne. Man muß natürlich hier von den sogenannten Gelegenheitsurfachen, auf die ich nachher noch mit einigen Worten eingehen werde, gänzlich absehen. Wenn also bei einem Individuum, welches immer gesund gewesen, wenigstens was Nervenkrankheiten anbelangt, auf welches in keiner Beziehung eine erbliche Belastung ruht, bei welchem kein Potatorium, keine äußere Verletzung irgend welcher Art nachgewiesen werden kann, plötzlich Epilepsie zum Ausbruche kommt, so muß man solche Fälle in ätiologischer Beziehung in diese Kategorie einreihen, wie nachstehenden Fall aus der hiesigen medizinischen Poliklinik.

¹⁾ Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. I.

IX. Fall.

Therese H., 32 Jahre alt, Hausmeistersfrau von München, ist, wie eine genaue Anamnese ergibt, durchaus nicht erblich belastet und war mit Ausnahme eines Typhus, den sie vor fünf Jahren durchgemacht hat, stets gesund. Menfes traten im sechszehnten Lebensjahre zum ersten Male ein und kehrten seit dieser Zeit regelmäfsig wieder und sind ziemlich stark. Patientin hat drei Mal geboren; Schwangerschaften, Geburten und Wochenbett sind ohne Störungen verlaufen. Seit ungefähr $2\frac{1}{2}$ Jahren hat Patientin nun epileptoide Anfälle, welche zum ersten Male eintraten, als sie plötzlich ihren Mann aus einer Kopfwunde blutend erblickte. Seit dieser Zeit nun traten die Anfälle wiederholt ein und zwar immer um die Zeit der Periode herum. Die Anfälle beginnen mit Reifsen im Kopf und Verziehungen der Gesichtsmuskulatur und Flimmern vor den Augen, dann wird Patientin vollständig bewußtlos, welcher Zustand ungefähr 5—10 Minuten dauert, wenigstens wurde diese Zeit beobachtet, als Patientin einen Anfall bekam, als sie sich gerade in der Poliklinik vorstellte. Im Uebrigen ist Patientin ganz wohl und gesund, nur will sie in letzter Zeit eine psychische Verstimmung an sich verspürt haben. Es ist dies unzweifelhaft ein Fall von Epilepsia mitior, da während des Anfalles bei vollkommener Bewußtlosigkeit die Krämpfe oder Zuckungen sozusagen vollständig fehlen, abgesehen von der Verzerrung der Gesichtsmuskulatur. Eben die vollkommene Bewußtlosigkeit schließt die Verwechslung mit hysterischen Anfällen entschieden aus. Der Anblick ihres verwundeten, blutenden Mannes war ohne Zweifel nur die Gelegenheitsursache, welche den Ausbruch der Erscheinungen bedingt hat, während für die eigentliche Entstehung der Krankheit durchaus keine ätiologischen Momente vorliegen.

Was nun die zweite Hauptfrage Nothnagel's in Betreff der Aetiologie der Epilepsie angeht, welche Momente veranlassen den Ausbruch der epileptischen Erscheinungen, so sind

in dieser Beziehung allerlei denkbare und undenkbare Dinge angeführt und herbeigezogen worden. Der schon mehrfach erwähnte berühmte Forscher Ruffel Reynolds hat in dieser Beziehung die occasionellen Ursachen in vier Klassen getheilt ¹⁾; in die erste bringt er diejenigen, deren Wirkung eine psychische war, wie Aufregung des Geistes und Gemüthes; in die zweite die, welche ihre Wirkung durch das motorische oder reflektive Centrum ausüben, wie excentrische Irritationen; in die dritte solche, deren Wirkung durch das allgemeine, vegetale oder organische System zu Stande kommt, wie Schwangerschaft, Fieber etc. und endlich in die vierte solche, deren Wirkung als physikalische aufgefaßt werden kann, wie Sonnenstich und mechanische Verletzungen.

Es würde zu weit führen, wollte ich auf alle diese möglichen und unmöglichen Ursachen im Einzelnen noch näher eingehen und es mag genügen, wenn ich noch kurz die Momente erwähne, welche in den von mir mitgetheilten Fällen den Ausbruch der Anfälle veranlaßt, resp. ihre Wiederkehr begünstigt haben. Im Falle IX war es zweifellos der Schreck beim Anblicke der blutenden Kopfwunde ihres Mannes, welcher den ersten Anfall herbeiführte, für die weiteren Fälle schien der Eintritt der Periode jedesmal diese Rolle zu spielen, wie dies ja sehr häufig der Fall ist, wie auch im Falle III, wo die Periode auch die Wiederkehr der Anfälle begünstigte. In diesem Falle war auch noch zu konstatiren, daß der Genuß ungewohnter Speisen den Ausbruch der Anfälle begünstigte. Was Schwangerschaft betrifft, so war im Falle VII zu konstatiren, daß in der ersten Hälfte der Schwangerschaft die Anfälle ungemein häufiger, dagegen in der zweiten Hälfte derselben gar nicht mehr eintraten, während im Falle III die Patientin angab, daß sie während ihrer zehn Schwangerschaften auch nicht einen einzigen Anfall gehabt habe. In

¹⁾ Reynolds Epilepsie, übersetzt von Beigel, Erlangen 1865. Seite 132.

den übrigen mitgetheilten Fällen war in dieser Beziehung nichts zu eruiren. Ausser den schon erwähnten veranlassenden Ursachen sind die wichtigsten dann noch geistige Ueberanstrengung sowohl wie starke Muskelanstrengungen mit Ermüdung, was besonders von Tissot und Radcliffe betont worden ist, wofür auch Reynolds und Nothnagel selbst beobachtete Beispiele erzählen. Dann ferner noch geschlechtliche Ueberreizungen, Sonnenstich u. s. w.

Schliesslich sei nun noch erwähnt, dass es Verhältnisse gibt, welche, ohne an und für sich zur Epilepsie führen zu können, doch eine gewisse Disposition zur Entwicklung derselben bedingen, dergestalt, dass bei ihrem Vorhandensein die eigentlichen Ursachen wirkfamer werden. In dieser Beziehung ist, wie alle Beobachter betonen, von grosser Wichtigkeit das Alter und gerade der Abschnitt von 7—17 Jahren, obwohl auch Fälle bekannt sind, dass die Entwicklung der Epilepsie erst im 70. Lebensjahre statt hatte, wie Reynolds einen derartigen mittheilt, so dass man keine Altersstufe als frei erklären kann. Was das Geschlecht betrifft, so ist durch die neueren Untersuchungen festgestellt, dass es ziemlich gleich häufig bei beiden Geschlechtern zur Entwicklung der Krankheit kommt, während ältere Beobachtungen das häufigere Vorkommen beim weiblichen Geschlechte konstatiren zu müssen glaubten.

Auch die klimatischen Verhältnisse scheinen ohne besonderen Einfluss zu sein.

Zum Schlusse bleibt mir noch die angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Seitz, welcher mir die Anregung zu dieser Arbeit gegeben und mich in jeder Weise auf's freundlichste unterstützt hat, besonders durch Ueberweisung der Fälle zur Veröffentlichung, meinen aufrichtigsten und wärmsten Dank hier öffentlich auszusprechen.
